

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату ДИВІГЕЛЬ (DIVIGEL)

Склад: діюча речовина: естрадіол; 1 пакетик містить естрадіолу гемігідрату еквівалентно 0,5 мг або 1 мг естрадіолу. **Фармакотерапевтична група.** Естрадіол. Код ATХ G03C A03. **Фармакологічні властивості.** Біодоступність естрадіолу при застосуванні препарату Дивігель становить 82%. **Показання.** Симптоми, пов'язані з дефіцитом естрогенів, при природній або штучній менопаузі. Для профілактики постменопаузального остеопорозу з високим ризиком перелому, коли інші лікарські засоби для профілактики остеопорозу протипоказані або непридатні. **Протипоказання.** Рак молочної залози. Діагностовані або підозрювані естрогензалежні злоякісні пухлини. Вагінальні крововтечі нез'ясованої етіології. Гіперплазія ендометрія, що не лікувалася. Тромбоемболічні захворювання вен, у тому числі в анамнезі. Виявлене підвищене згортання крові. Гостра тромбоемболія артерій, у тому числі в анамнезі. Гострі захворювання печінки, у тому числі в анамнезі (до нормалізації лабораторних показників функцій печінки). Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Порфірія. **Застосування у період вагітності або годування грудю.** Застосування Дивігелю у період вагітності або годування грудю не показане. Якщо пацієнка завагітніла під час терапії, лікування Дивігелем слід негайно припинити.

За результатами більшості епідеміологічних досліджень, випадкове застосування естрогену під час вагітності не має тератогенного або фетотоксичного ефекту.

Способ застосування та дози. Дивігель – це гель для трансдермального застосування, призначений для тривалого або циклічного лікування. Звичайна початкова доза становить 1 г гелю на добу, що відповідає 1 мг естрадіолу. Тривалість застосування і дози підбирає лікар з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки.

Упаковка: по 0,5 г або 1 г гелю у пакетику; по 28 пакетиків у картонній коробці.

Як застосовувати Дивігель?

Дивігель слід наносити 1 раз на добу на чисту суху шкіру стегон або нижньої частини тулуба, регулярно змінюючи місце нанесення.

Біодоступність естрадіолу при застосуванні

Дивігелю становить 82%

Більш детальна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату Дивігель.

1. Эстрогендефицитные состояния у молодых женщин: что мы можем? Информационный бюллетень № 15 (75) 2016, StatusPraesens.

2. Назаренко Т.А., рекомендации для практического применения. Эстрогены в репродуктивной медицине, Москва, 2016.

3. Прегравидная подготовка / клинический протокол / [авт.-сост. В.Е. Радзинский и др.]. – М.: П71 Редакция журнала StatusPraesens, 2016. – 80 с.

4. Применение препарата Дивигель во вспомогательных репродуктивных технологиях: монография / О.А. Берестовой. - К.: РПХ «Ферзь», 2010 – 48 с.

Інформаційний матеріал для медичних закладів та лікарів, також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Не є реклами. Більш детальну інформацію можна отримати від медичного представника Оріон Корпорейшн та з інструкції для медичного застосування.

Надано персонально:


П.І.Б.

Дата:

Номер матеріалу: OP-UA/7892/01/01/6

ОРИОН КОРПОРЕЙШН
Оріонінте, 1, 02200, Еспоо, Фінляндія
Тел.: +358 10 426 11
Факс: +358 10 426 38 15
www.orionpharma.com

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ
04116, Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 309
Тел.: +380 44 230 47 21
Факс: +380 44 230 47 22
E-mail: office@orionpharma.com.ua
www.orionpharma.com.ua



Р.П. №UA/7892/01/01



Дивігель

Час нових можливостей

Замісна гормональна терапія
при симптомах дефіциту
естрогенів у програмах ДРТ



Дивігель в програмах ДРТ^{1, 4}

Естрогени застосовуються у ДРТ:¹

традиційно...

- У програмах з донорськими ооцитами
- У пацієнток зі зниженим оваріальним резервом

так само...

У протоколах, де потрібна підготовка ендометрію до переносу ембріонів і гормональна підтримка у посттрансферному періоді:¹

- програми з консервованими ембріонами;
- програми сурогатного материнства;
- протоколи стимуляції суперовуляції у пацієнток з гіпоплазією ендометрію.



«Естрогеновий прайлінг» – ще одна можливість поліпшити результати ЕКЗ:²

Застосування Дивігелю в період підготовки пацієнток із «бідною відповіддю» на лікувальний цикл може сприяти:

- підвищенню чутливості яєчників до подальшої стимуляції;
- одержанню більшої кількості зростаючих фолікулів і отриманих ооцитів;
- покращенню якості ооцитів;
- більш синхронному росту фолікулів;
- підвищенню % заплідненості зрілих ооцитів;
- кращому дробленню ембріонів.

Пік ЛГ ↓														естрадіол трансдермально 2 мг (Дивігель 2 г)																		
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	22	23	24	25	26	27	28	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28
Цикл, що передує лікувальному														Лікувальний цикл																		

Призначення препаратів естрадіолу протягом 2–3 місяців у лютейну фазу (з 21-го дня) менструальних циклів, що передують лікувальному, сприяє збільшенню кількості та підвищенню якості ооцитів²

ДРТ – допоміжні репродуктивні технології; ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення; ЛГ – лютейнізуючий гормон.

Якість доступних доказів за фармакологічною групою 17 β -естрадіол – «В»³